

CHITOSANO COMPOSTO



Il Chitosano Composto è un integratore alimentare a base di estratti vegetali per il controllo del metabolismo dei grassi e del senso di fame

CHITOSANO COMPOSTO




Principi attivi	mg per 4 cps*	Uso prevalente
Chitosano (derivato da crostacei) altamente purificato polvere	1500	Riduce lo stimolo della fame, l'assimilazione dei grassi.
Garcinia cambogia (Garcinia cambogia Gaernt. Desr.) buccia del frutto estratto secco	200	Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo. Controllo del senso di fame.
Vitamina C	180	Antiossidante.

*dose giornaliera consigliata.

GARCINIA CAMBOGIA

Moderatore della sensazione di fame grazie anche alla regolazione dei livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e all'aumento della serotonina.



GARCINIA CAMBOGIA

COMPONENTI PRINCIPALI: ACIDO IDROSSICITRICO
MECCANISMO D'AZIONE




L'HCA inibisce l'enzima citrato liasi nel corpo, enzima conosciuto come importante catalizzatore nel processo metabolico di conversione dei carboidrati in eccesso in grassi.

Aiuta inoltre a gestire l'ormone dello stress (cortisolo) dando la possibilità di attaccare efficacemente il grasso addominale.

GARCINIA CAMBOGIA


COMPONENTI PRINCIPALI: ACIDO IDROSSICITRICO
MECCANISMO D'AZIONE



“Fitoterapia. Impiego razionale delle droghe vegetali”. Capasso, Grandolini, Izzo

CHITOSANO

Il chitosano è un polisaccaride lineare
composto da unità di
D-glucosamina e N-acetil-D-glucosamina
legate tra loro attraverso legami β -1,4



CHITOSANO

MECCANISMO D'AZIONE



Il chitosano, attraversando il mezzo acido dello stomaco, acquisisce una carica positiva nei gruppi degli amminoacidi liberi che si distinguono dalle catene di N-acetil-D-glucosammina.

I lipidi hanno una carica negativa che gli forniscono i gruppi COOH . Questo meccanismo porta all'attrazione elettrostatica con il chitosano e alla successiva formazione di un gel che intrappola così i lipidi, limitandone l'assorbimento.

**RIDUZIONE
ASSORBIMENTO
GRASSI A
LIVELLO
INTESTINALE**

ASSORBIMENTO CON LA DIETA – CRITICITÀ


Frutta e verdura che vengono conservate per troppo tempo, presentano ingenti perdite di questa sostanza.

Nei fumatori, il turnover metabolico della vitamina C aumenta di oltre il 40%, pertanto il fabbisogno raddoppia rispetto ai non fumatori.



VITAMINA C


DANNO INDOTTO DAI RADICALI LIBERI



VITAMINA C

ANTIOSSIDANTE IDROGENO DONATORE

Interrompe la catena donando un atomo di idrogeno ai radicali perossili



PERCHÉ CHITOSANO COMPOSTO

GARCINIA
CAMBOGIA

LIMITA IL SENSO
DELLA FAME

VITAMINA C

AZIONE
ANTIOSSIDANTE

CHITOSANO

LIMITA
L'ASSORBIMENTO DEI
GRASSI

ELIMINA IL SENSO DELLA FAME E LIMITA
L'ASSORBIMENTO DEI GRASSI



Laboratorio Sodini S.r.l.
Tel. +39 055 8587203 | Fax +39 055 8547368
www.laboratoriosodini.it

